

**⚠ 使用上の注意**



**してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。) 次の人は服用しないでください。

- (1) 胃腸の弱い人
- (2) 下痢しやすい人



**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
  - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。  
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

**【用法及び用量】**

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人 (15歳以上)	10丸	3 回
15 歳 未 満	服用しないこと	

食間又は空腹時に水又は温湯にて服用する。  
添付のさじで1回量をはかっておのみください。

食間とは…

食後2～3時間を指します。

**【成分及び分量】**

30丸 (6,000mg、1日量) 中

成 分	含 量	成 分	含 量
ジ オ ウ	1,461mg	ブ ク リ ョ ウ	548mg
サンシュユ	731mg	ポ タ ン ビ	548mg
サンヤク	731mg	ケ イ ヒ	183mg
タクシャ	548mg	炮 附 子	183mg

添加物としてハチミツ、寒梅粉、白色セラックを含有します。

**【効能又は効果】**

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿とときに口渇があるものの次の諸症：

下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）、軽い尿漏れ

● 体力中等度以下

● 高齢者のかすみ目

● 口渇

● 高血圧に伴う随伴症状  
頭重  
耳鳴り  
肩こり

- 疲れやすい
- 四肢が冷えやすい
- むくみ
- かゆみ

- 尿量減少又は多尿
- 排尿困難
- 残尿感
- 夜間尿
- 頻尿
- 軽い尿漏れ

● 腰痛  
● 下肢痛  
● しびれ

