

第2類医薬品

使用前にこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

漢方外用薬

ちゅう
中

おう
黄

こう
膏 ダイコー

中黄膏は、華岡青洲の「春林軒膏方」に記載される外用の漢方製剤です。
はれものの初期、うち身、ねんごに常備薬としてご使用ください。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 湿潤・ただれ・やけどのひどい人。
 - (4) 傷口が化膿している人。
 - (5) 患部が広範囲の人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

【効能又は効果】

急性化膿性皮膚疾患（はれもの）の初期、うち身、ねんご

【用法及び用量】

適宜患部に塗布するか、ガーゼ等に展延し患部に貼付する。

＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 外用にのみ使用してください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。
- (4) 衣類等につかないよう注意してください。(黄褐色の軟膏のため。)



【成分及び分量】

本品 50g中

成分	含量
オウバク末	0.7g
ウコン末	1.4g
ミツロウ	13.2g
ゴマ油	34.7g

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

大晃生薬有限公司 試験室

電話：フリーダイヤル 0120-335064

受付時間：9時～12時, 13時～17時(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：フリーダイヤル 0120-149-931



大晃生薬有限公司

〒464-0084 名古屋市千種区松軒一丁目5番12号